

# CBDCA+PTX+ベバシズマブ ±アテゾリズマブ

(カルボプラチン+  
パクリタキセル+  
ベバシズマブ±  
アテゾリズマブ) 療法

- 非小細胞肺癌に対する治療法です。
- 21日(3週)ごとの治療です。4~6コース投与します。
- 非扁平上皮がんにはベバシズマブを併用し、4~6コース投与後はベバシズマブ単剤療法を継続します。
- 扁平上皮がんにはベバシズマブは使いません。

## 治療スケジュール



お薬の名前 投与量/投与時間	お薬の役割	投与期間(日)							治療中に気をつけてほしいこと
		1	2	3	4	...	21		
アプレピタント(イメンド®) 125mg:1日目(パクリタキセル 投与1~1.5時間前)、 80mg:2・3日目(午前中)	吐き気止め 【内服】 	○	○	○					
デキサメタゾン (デカドロン®)9.9mg + d-クロルフェニラミン (ボララミン®)5mg + ファモチジン (ガスター®)20mg + パロノセトロン(アロキシ®) 0.75mg	吐き気止め アレルギー予防 【点滴】 	↓							
アテゾリズマブ (テセントリク®) 1,200mg/body 1時間 初回	治療のお薬 【点滴】 	↓					休業	休業	発熱や皮疹がみられたら教えてください。
ベバシズマブ (アバステン®) 15mg/kg 1.5時間 初回	治療のお薬 【点滴】 	↓							血圧が上がったり、タンパク尿が出たりします。むくみが出たら要注意です。
パクリタキセル (タキソール®) 200mg/m <sup>2</sup> 3時間	治療のお薬 【点滴】 	↓							点滴を入れているところやその周りが腫れた場合や痛いときは、すぐに教えてください。
カルボプラチン (パラプラチン®)AUC 6 1時間	治療のお薬 【点滴】 	↓							かゆみやじんましん、息苦しさが出たときは、すぐに教えてください。
デキサメタゾン(デカドロン®) 4mg/日【1日1~2回】	吐き気止め 【内服】 		○	○	○				血糖値が高くなったり、夜に飲んだりすると眠れなくなります。

※ベバシズマブは初回90分、2回目以降は60分→30分まで短縮可。  
※ベバシズマブ維持療法:15mg/kgを3週ごと。




合計点滴時間 1日目 7時間 ※アテゾリズマブは2回目以降は30分



### 注意事項

- 点滴が漏れることがあります。腫れたり痛みが出たりした場合は、教えてください。
- 点滴にアルコールが入っています。来院するときは、公共の交通機関を利用してください。

# どんな副作用がいつごろみられる？



## 副作用を防ぎましょう



### ✔ 出血に気をつけましょう

血が出ると止まりにくい状態になります。体をぶついたり、けがをしたりしないようにしましょう。

### ✔ ばい菌から体を守りましょう

必ず手洗い・うがいをしましょう。歯磨きや舌ブラッシングも大切です。

### ✔ 吐かないために……

食べたいもの、食べられるものを少しずつ食べましょう。脂っこいもの、においの強いものは避けましょう。



## 副作用の対策をしましょう



### ベパシズマブ

#### ▶ 血圧が上がります

自宅でも毎日、血圧を測定する習慣を身につけましょう。

### パクリタキセル

#### ▶ 手足がしびれてきます

治療を重ねるごとにしびれが強くなってきます。ボタンをかけられますか？ お箸を持てますか？ 我慢せずに症状を伝えてください。



お仕事・趣味を続けるために

たとえば**お料理**が趣味の人だったら……

### 末梢神経障害

しびれで物がつかみにくくなったりするため、包丁の使用には注意しましょう。

### 血小板減少

包丁で指を切らないように注意しましょう。誤って切ってしまったときに備えて、ばんそうこうなど止血に使う道具をすぐ使える場所に置いておきましょう。ピーラーを活用するのもお勧めです。

