

## お詫びと訂正

『INFECTION CONTROL』2024年夏季増刊『ビギナーさんのためのAST活動&抗菌薬適正使用ガイドブック』の第5章「代表的な細菌と抗菌薬」<薬剤編>9「グラム陰性菌（腸内細菌目細菌）のための薬剤」の表4「CFDCの腎機能に応じた投与量」に誤りがございました。著者および読者の皆さまに謹んでお詫び申し上げますとともに、以下に訂正いたします。

【誤】

■表4 CFDCの腎機能に応じた投与量

Ccr (mL/min)	1回投与量	投与間隔	投与時間
$60 \leq \text{Ccr} < 120$	2 g	8時間ごと	3時間
$30 \leq \text{Ccr} < 60$	1.5 g	8時間ごと	3時間
$15 \leq \text{Ccr} < 30$	1 g	8時間ごと	3時間
$\text{Ccr} < 15$	0.75 g	12時間ごと	3時間
血液透析患者	0.75 g	12時間ごと	3時間
$\text{Ccr} \leq 120$ (腎クリアランス亢進)	2 g	6時間ごと	3時間

【正】

■表4 CFDCの腎機能に応じた投与量

Ccr (mL/min)	1回投与量	投与間隔	投与時間
$60 \leq \text{Ccr} < 120$	2 g	8時間ごと	3時間
$30 \leq \text{Ccr} < 60$	1.5 g	8時間ごと	3時間
$15 \leq \text{Ccr} < 30$	1 g	8時間ごと	3時間
$\text{Ccr} < 15$	0.75 g	12時間ごと	3時間
血液透析患者	0.75 g	12時間ごと	3時間
$120 \leq \text{Ccr}$ (腎クリアランス亢進)	2 g	6時間ごと	3時間